

**FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**  
**FRONTPRO 11 mg compresse masticabili per cani 2-4 kg**  
**FRONTPRO 28 mg compresse masticabili per cani >4-10 kg**  
**FRONTPRO 68 mg compresse masticabili per cani >10-25 kg**  
**FRONTPRO 136 mg compresse masticabili per cani >25-50 kg**

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
GERMANIA

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
4 Chemin du Calquet  
31000 Toulouse  
FRANCIA

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

FRONTPRO 11 mg compresse masticabili per cani (2-4 kg)  
FRONTPRO 28 mg compresse masticabili per cani (> 4-10 kg)  
FRONTPRO 68 mg compresse masticabili per cani (> 10-25 kg)  
FRONTPRO 136 mg compresse masticabili per cani (> 25-50 kg)  
afoxolaner

**3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni compressa masticabile contiene:

| <b>FRONTPRO</b>                         | <b>Afoxolaner (mg)</b> |
|---|------------------------|
| Comprese masticabili per cani 2-4 kg    | 11,3                   |
| Comprese masticabili per cani >4-10 kg  | 28,3                   |
| Comprese masticabili per cani >10-25 kg | 68                     |
| Comprese masticabili per cani >25-50 kg | 136                    |

Comprese variegata di colore da rosso a bruno rossastro, di forma rotonda (comprese per cani di peso compreso tra 2 e 4 kg) o di forma rettangolare (comprese per cani di peso compreso tra >4 e 10 kg, compresse per cani di peso compreso tra >10 e 25 kg e compresse per cani di peso compreso tra >25 e 50 kg).

**4. INDICAZIONE(I)**

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis* e *C. canis*) nei cani, per almeno 5 settimane.

Trattamento delle infestazioni da zecche (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) nei cani. Un trattamento elimina le zecche fino ad un mese.

Per potere essere esposte al principio attivo pulci e zecche devono attaccarsi all'ospite ed iniziare il pasto di sangue.

## **5. CONTROINDICAZIONI**

Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

## **6. REAZIONI AVVERSE**

Segni neurologici (convulsioni, atassia e tremori muscolari), prurito, letargia, anoressia e disturbi gastrointestinali lievi (vomito, diarrea), sono stati riportati molto raramente. La maggior parte delle reazioni avverse segnalate era autolimitante e di breve durata.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

## **7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

## **8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Per uso orale.

### Dosaggio:

Il prodotto deve essere somministrato secondo la tabella seguente per garantire un dosaggio compreso tra 2,7 e 7 mg/kg di peso corporeo:

| <b>Peso corporeo del cane (kg)</b> | <b>Dosaggio e numero delle compresse masticabili da somministrare</b> |                       |                       |                        |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                    | <b>FRONTPRO 11 mg</b>   | <b>FRONTPRO 28 mg</b> | <b>FRONTPRO 68 mg</b> | <b>FRONTPRO 136 mg</b> |
| 2-4                                | 1   |                       |                       |                        |
| >4-10                              |   | 1                     |                       |                        |
| >10-25                             |   |                       | 1                     |                        |
| >25-50                             |   |                       |                       | 1                      |

Per cani di peso corporeo superiore a 50 kg, usare una combinazione opportuna delle compresse masticabili aventi dosaggio diverso/uguale.

Le compresse non devono essere divise.

## Programma di trattamento:

### *Trattamento delle infestazioni da pulci e zecche:*

Per un controllo ottimale delle infestazioni da pulci e zecche, si deve somministrare il prodotto ad intervalli mensili nei periodi di maggiore stagionalità per le pulci e/o le zecche, in base alla situazione epidemiologica locale.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Le compresse di FRONTPRO sono masticabili, al sapore di manzo e appetibili per la maggior parte dei cani. È possibile somministrare le compresse con il cibo nel caso il cane non accettasse di assumerle direttamente.

## **10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo SCAD/EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.  
Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

## **12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Per consentire l'esposizione dei parassiti all'afoxolaner, è necessario che questi inizino il pasto di sangue sull'ospite; quindi non è possibile escludere il rischio di trasmissione di malattie provenienti dal parassita.

Quando si trattano infestazioni da parassiti, tutti gli animali a contatto devono essere trattati contemporaneamente con un prodotto idoneo.

Le pulci, ad ogni stadio di crescita, possono infestare la cuccia del cane e le aree di riposo abituali come tappeti e tessuti d'arredamento. Queste zone, in caso di infestazioni massive da pulci e all'inizio del trattamento antiparassitario, dovrebbero essere trattate con un prodotto ambientale apposito e poi ripulite regolarmente con un aspirapolvere.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

In assenza di dati disponibili si deve consultare un veterinario prima di trattare i cuccioli di età inferiore alle 8 settimane e/o cani di peso inferiore a 2 kg.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Per impedire ai bambini l'accesso al farmaco veterinario rimuovere dal blister solo una compressa per volta. Riporre il blister con le restanti compresse masticabili nella scatola.  
Lavare le mani dopo la manipolazione del prodotto.

### Gravidanza e allattamento:

Studi di laboratorio eseguiti nei ratti e nei conigli non hanno evidenziato l'esistenza di effetti teratogeni, o di alcuna reazione avversa sulla capacità riproduttiva di soggetti maschi e femmine.

La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento o nei cani da riproduzione non è stata stabilita. Consultare un veterinario prima del trattamento durante la gravidanza e l'allattamento o prima dell'uso in cani da riproduzione.

Sovradosaggio (sintomi, procedura d'emergenza, antidoti):

Non si sono notate reazioni avverse in cuccioli sani di razza Beagle di età superiore alle 8 settimane trattati con un dosaggio pari a 5 volte la dose massima, ripetuto 6 volte a intervalli da 2 a 4 settimane.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Tutte le informazioni su questo medicinale veterinario si trovano sul sito Web dell'Agenzia Europea per i Medicinali (<http://www.ema.europa.eu/>).

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

L'afoxolaner è un insetticida e acaricida appartenente alla famiglia delle isoxazoline.

FRONTPRO è efficace nei confronti delle pulci adulte come anche nei confronti di molte specie di zecche come *Dermacentor reticulatus* e *D. variabilis*, *Ixodes ricinus* e *I. scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, e *Haemaphysalis longicornis*.

FRONTPRO elimina le pulci entro 8 ore e le zecche entro 48 ore.

Il prodotto elimina le pulci prima che producano le uova prevenendo quindi la contaminazione della casa.

Per ciascun dosaggio, le compresse masticabili sono disponibili nei seguenti formati:  
Scatola contenente 1 blister da 1, 3 o 6 compresse masticabili.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**België/Belgique/Belgien**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Република България**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Tel: +43 1 80 105-0

**Česká republika**

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Tel: +420 234 655 111

**Danmark**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

**Lietuva**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Tel: +43 1 80 105-0

**Luxembourg/Luxemburg**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

**Magyarország**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG  
Magyarországi Fióktelep  
Tel: +36 1 299 8900

**Malta**

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited

Tlf: + 45 3915 8888

**Deutschland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Tel: 0800 290 0 270

**Eesti**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

**Ελλάδα**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Τηλ: +49 - 6132 - 77 0

Γερμανία

**España**

Boehringer Ingelheim Animal Health España,  
S.A.U.

Tel: +34 93 404 51 00

**France**

Boehringer Ingelheim Animal Health France, SCS

Tél: +33 472723000

**Hrvatska**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

**Ireland**

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited

Tel: +44 1344 424 600

**Ísland**

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

**Italia**

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

Tel: +39 02 53551

**Κύπρος**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Τηλ: +49 - 6132 - 77 0

Γερμανία

**Latvija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

Tel: +44 1344 424 600

**Nederland**

Boehringer Ingelheim Animal Health

Netherlands bv

Tel: +31 72 566 2411

**Norge**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Tlf: + 45 3915 8888

**Österreich**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

**Polska**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 699 0 699

**Portugal**

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,

Unipessoal, Lda.

(+351) 21 313 5300

**România**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

**Slovenija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

**Slovenská republika**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.

Tel: +421 2 5810 1211

**Suomi/Finland**

Vetcare Oy

Puh/Tel: + 358201443360

**Sverige**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Tlf: + 45 3915 8888

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited

Tel: +44 1344 424 600